

Indicadores de Protección Específica y Detección Temprana por Entidad Territorial

Departamento: Caldas

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)

Régimen: Todos

Período: I trimestre 2018

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
17001 – MANIZALES	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	21,81	29,73	36,93	44,04	41,54
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	39,02	41,04	47,59	51,05	57,89
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	22,90	49,51	45,33	57,16	63,78
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	100	8,89	4,35	50,00	37,50
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	35,80	61,37	42,58	38,98	55,78
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	26,02	25,92	30,49	35,32	42,16
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	35,76	44,13	53,26	59,60	30,03
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	28,93	39,54	46,03	52,35	44,99
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	39,67	50,97	58,95	67,41	69,09
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	19,47	18,30	28,28	43,80	29,44
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	21,86	18,70	20,22	39,36	31,70
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	14,77	22,50	32,43	48,65	48,88
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	11,50	18,29	21,83	22,41	22,48
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	7,74	6,43	9,67	8,88	8,88
	Proporción de personas con consulta del adulto	16,29	18,52	25,88	30,36	22,48
	Proporción de personas con consulta del joven	16,24	18,40	26,50	34,71	27,57
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	4,23	5,92	11,11	14,66	8,89
Proporción de personas con control de placa bacteriana	18,02	16,23	22,22	29,50	22,08	

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	7,41	8,37	13,26	17,88	10,52
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	65,64	75,34	81,56	85,97	86,89
	Proporción de recién nacidos con Sífilis Congénita y tratamiento terminado				100	
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,03	0,14	0,22	0,23	0,77
17013 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	21,57	10,60	31,34	29,50	17,19
AGUADAS	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	16,67	7,28	35,07	19,42	67,19
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	23,53	22,08	58,21	70,50	93,75
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00	0,00		
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	32,68	15,67	64,18	78,42	95,31
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	19,61	11,48	34,33	30,94	51,56
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	41,83	38,41	64,93	76,98	92,19
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	22,88	11,92	32,84	35,25	17,19
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	14,21	35,68	53,24	70,02	78,17
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	3,49	5,79	18,70	27,56	31,91
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	8,33	8,89	26,68	36,84	35,96
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	3,61	9,54	20,09	31,32	36,05
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,52	1,44	1,80	2,59	2,75
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	18,18	26,67	25,00	21,62	19,05
	Proporción de personas con consulta del adulto	1,24	7,70	5,06	11,96	10,39
	Proporción de personas con consulta del joven	2,55	10,66	15,26	19,81	21,92
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	1,09	1,26	1,78	3,59	2,68
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	16,46	25,14	23,50	32,84	31,28
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	3,77	4,67	9,84	13,04	17,26

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	22,82	41,63	51,18	59,23	63,21
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,02	0,11	0,38	0,64	0,00
17042 – ANSERMA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	17,58	23,18	21,38	23,13	8,54
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	15,52	18,64	18,75	21,09	54,88
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	10,44	9,55	23,36	76,19	73,17
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00			
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	14,84	40,91	75,66	83,67	68,29
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	13,74	26,82	43,42	73,47	69,51
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	32,97	32,27	21,71	76,53	68,90
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	23,08	26,36	22,37	26,87	9,15
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	15,14	19,09	56,93	80,98	84,96
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	11,22	8,60	20,20	53,49	49,58
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	4,01	5,95	8,12	36,03	30,78
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	9,48	15,78	30,58	52,85	56,41
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	4,78	10,55	13,99	15,62	15,23
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	4,00	3,85	7,95	7,48	9,35
	Proporción de personas con consulta del adulto	10,89	19,52	32,93	58,19	45,01
	Proporción de personas con consulta del joven	6,13	8,73	22,09	48,11	48,37
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,41	0,10	0,52	1,39	0,89
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	22,73	16,84	65,83	79,07	43,90
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	10,19	2,99	23,78	46,62	45,17
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	37,94	42,49	86,37	92,46	92,83
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,11	0,38	0,27	0,04	0,01

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
17050 – ARANZAZU	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	52,63	46,88	40,63	11,64	9,01
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	50,00	53,13	10,16	6,85	49,55
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	10,53	28,13	3,91	8,22	71,17
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	57,89	59,38	81,25	90,41	94,59
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	52,63	68,75	43,75	40,41	45,95
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	68,42	81,25	62,50	73,29	83,78
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	68,42	62,50	44,53	12,33	9,01
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	3,66	13,04	39,89	49,08	62,58
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	2,42	4,25	17,92	20,68	27,58
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	4,22	13,41	26,23	30,59	30,48
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	7,08	15,77	37,02	34,49	35,72
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	3,14	5,32	4,64	5,85	5,89
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	14,29	0,00	4,35	7,69	6,06
	Proporción de personas con consulta del adulto	3,97	4,35	2,49	2,33	1,68
	Proporción de personas con consulta del joven	2,37	6,40	10,57	11,17	12,21
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	1,46	1,46	2,67	2,62	2,67
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	1,94	14,18	25,51	24,96	25,71
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	2,05	3,69	4,16	3,26	5,68
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	7,15	23,62	54,64	57,25	59,66
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17088 – BELALCÁZAR	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	23,39	1,71	1,69	6,94	33,33
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	4,19	3,07	2,54	11,11	22,22
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	18,13	3,41	1,69	4,17	44,44

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	100	0,00	0,00		
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	46,78	6,48	11,02	13,89	33,33
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	0,58	1,71	1,69	9,72	44,44
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	36,84	10,24	5,93	23,61	55,56
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	38,01	7,51	6,78	13,89	33,33
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	22,19	24,00	52,88	67,14	66,38
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	10,67	10,75	8,37	38,00	16,87
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	23,16	16,70	12,92	31,85	13,82
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	1,25	5,84	9,09	24,65	25,24
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	1,61	4,86	4,56	5,68	5,62
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	33,33	0,00	0,00	5,56	5,88
	Proporción de personas con consulta del adulto	6,44	20,95	2,93	39,35	4,98
	Proporción de personas con consulta del joven	13,28	39,05	5,71	34,00	10,77
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,35	0,11	0,82	2,24	0,00
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	9,25	28,46	23,92	58,10	6,51
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	8,18	3,25	2,71	10,30	4,33
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	45,22	67,38	76,42	87,99	87,32
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,07	0,06	0,37	0,63	1,00
17174 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	4,55	3,39	5,37	7,01	6,75
CHINCHINÁ	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	8,60	8,42	12,49	27,07	27,65
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	5,02	21,96	22,85	37,58	37,62
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	60,00	33,33	50,00	0,00	
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	20,57	12,35	17,02	25,32	22,19

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	2,46	4,03	4,35	7,80	7,72
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	8,63	25,43	9,62	12,10	10,93
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	5,12	4,48	6,75	12,58	8,36
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	34,63	38,81	47,15	52,98	54,91
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	8,30	10,48	14,70	26,10	19,86
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	16,05	7,40	14,77	22,44	17,87
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	7,03	14,52	21,64	27,45	28,99
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	8,06	18,64	20,03	18,28	17,76
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	3,45	7,58	12,90	2,80	3,92
	Proporción de personas con consulta del adulto	12,34	12,36	13,80	17,04	17,71
	Proporción de personas con consulta del joven	12,38	12,32	18,78	23,95	21,66
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	2,28	5,40	6,11	7,55	5,06
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	16,60	9,08	16,18	22,10	14,30
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	10,41	8,60	9,07	14,11	6,92
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	48,62	58,35	69,89	74,76	76,03
	Proporción de recién nacidos con Sífilis Congénita y tratamiento terminado	0,00				
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,06	0,04	0,17	0,37	0,58
17272 -	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	45,28	41,46	14,52	15,69	2,99
FILADEFIA	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	16,00	17,07	8,06	17,65	8,96
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	5,66	4,88	4,84	11,76	4,48
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	49,06	46,34	32,26	29,41	31,34
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	43,40	36,59	17,74	17,65	22,39
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	47,17	43,90	51,61	76,47	73,13

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	47,17	48,78	24,19	17,65	8,96
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	14,26	18,74	27,14	33,50	37,49
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	7,05	7,70	6,87	12,11	13,72
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	6,82	10,49	9,25	13,00	15,47
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	7,92	17,05	24,57	29,04	30,84
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	1,02	3,18	4,41	4,22	4,29
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	0,00	0,00	19,05	14,29	12,90
	Proporción de personas con consulta del adulto	1,90	1,16	4,13	7,16	9,63
	Proporción de personas con consulta del joven	3,95	4,92	5,68	9,20	15,85
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,71	1,22	2,41	3,13	3,30
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	11,64	14,89	9,20	14,58	20,26
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	2,72	2,14	2,84	3,98	4,38
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	21,25	29,29	40,32	50,71	55,68
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,00	0,00	0,18	0,22	0,75
17380 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	2,44	5,57	8,10	29,83	42,00
LA DORADA	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	8,30	3,30	6,93	24,06	61,00
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	4,46	2,38	12,64	20,22	78,50
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	71,43	0,09	20,83	66,67	50,00
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	26,50	7,64	11,42	20,73	35,50
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	1,16	3,72	11,77	27,40	39,50
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	9,80	7,83	19,98	45,30	73,50
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	3,70	6,94	16,72	33,67	42,50
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	39,15	47,26	53,65	65,64	71,07

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	6,08	12,32	14,81	26,86	24,69
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	12,81	4,68	11,22	16,85	8,12
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	5,66	12,68	18,48	26,72	29,25
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,67	2,30	4,50	6,11	6,45
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	4,03	4,50	6,12	6,05	8,27
	Proporción de personas con consulta del adulto	10,34	16,24	11,06	21,19	20,98
	Proporción de personas con consulta del joven	11,11	13,66	14,85	25,70	23,53
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,46	4,18	6,41	8,81	3,05
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	27,70	18,98	22,36	29,71	14,71
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	13,61	7,34	9,74	22,80	11,65
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	49,12	62,36	74,15	79,56	81,40
	Proporción de recién nacidos con Sífilis Congénita y tratamiento terminado				50,00	
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,13	0,00	0,07	0,39	0,59
17388 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	16,67	10,00	12,50	4,00	3,23
LA MERCED	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	11,11	20,00	0,00	28,00	38,71
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	8,33	30,00	4,17	2,00	3,23
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	8,33	40,00	4,17	2,00	0,00
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	25,00	20,00	0,00	2,00	6,45
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	0,00	60,00	20,83	26,00	12,90
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	16,67	20,00	16,67	6,00	3,23
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	2,88	17,63	18,31	27,83	31,41
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	1,71	2,45	2,26	5,99	8,82
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	1,55	11,93	9,41	13,92	16,64

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	2,18	17,03	17,67	16,18	18,54
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,68	2,16	2,40	4,42	4,69
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	25,00	5,26	0,00	0,00	5,26
	Proporción de personas con consulta del adulto	0,38	2,97	4,59	11,25	11,98
	Proporción de personas con consulta del joven	1,47	6,46	8,37	12,01	15,48
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,59	1,29	2,52	3,44	2,96
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	5,37	7,01	1,81	11,03	20,16
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	2,51	2,81	1,12	4,96	10,22
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	8,33	16,54	28,37	47,44	56,25
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,00			0,00	0,00
17433 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	18,63	0,78	1,48	6,98	2,44
MANZANARES	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	8,12	1,56	22,22	30,23	17,07
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	11,76	1,95	2,59	2,33	3,66
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	22,06	17,58	38,52	6,98	15,85
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	2,94	1,56	2,22	13,18	23,17
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	23,53	4,30	4,07	18,99	34,15
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	19,12	1,56	2,59	15,89	9,76
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	27,29	28,68	37,01	46,42	47,59
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	4,57	4,89	6,80	17,63	11,01
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	20,89	13,02	16,40	23,17	12,47
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	5,33	6,45	9,77	8,32	8,76
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	1,93	2,81	2,54	2,12	2,33

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	6,67	7,69	5,88	11,76	11,76
	Proporción de personas con consulta del adulto	11,86	20,18	1,95	11,25	12,09
	Proporción de personas con consulta del joven	15,06	21,18	11,49	30,57	22,52
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,68	0,88	3,24	7,08	3,44
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	17,93	12,57	24,09	41,42	18,36
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	10,32	1,98	2,38	15,06	8,76
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	48,67	56,47	62,28	79,00	80,83
	Proporción de recién nacidos con Sífilis Congénita y tratamiento terminado				0,00	
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,21	0,42	0,38	0,24	0,20
17442 –						
MARMATO	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	11,11	16,67	19,23	15,07	15,00
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	17,65	5,56	26,92	23,29	40,00
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	11,11	27,78	23,08	8,22	7,50
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00	0,00		
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	38,89	16,67	57,69	78,08	95,00
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	11,11	55,56	50,00	26,03	17,50
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	38,89	61,11	57,69	41,10	90,00
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	22,22	33,33	61,54	35,62	15,00
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	1,52	7,16	15,01	23,73	27,34
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	0,86	2,01	3,20	7,13	7,98
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	0,96	8,52	6,98	11,97	10,12
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	1,42	3,69	7,22	14,10	16,42
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,56	1,38	2,38	3,10	3,06
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	0,00	0,00	10,00	6,25	5,26

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de personas con consulta del adulto	0,12	0,11	1,43	3,38	3,11
	Proporción de personas con consulta del joven	0,46	0,63	2,15	5,24	7,12
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,22	0,00	0,82	2,07	2,58
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	4,69	6,17	6,05	13,77	14,86
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	1,58	0,26	2,32	6,51	6,38
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	7,28	13,38	20,60	32,59	39,57
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
17444 – MARQUETALIA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	4,41	0,35	1,64	6,00	25,00
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	3,68	1,41	1,09	2,40	12,50
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	3,68	10,60	1,64	19,20	18,75
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00		0,00	
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	11,76	5,30	10,38	31,60	43,75
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	10,29	4,95	5,46	32,80	31,25
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	13,24	24,03	15,85	49,60	43,75
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	5,15	0,71	8,20	6,40	25,00
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	10,64	22,66	32,59	46,77	47,15
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	6,14	14,30	16,91	31,24	25,00
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	5,41	10,27	17,44	31,24	24,38
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	4,06	29,18	42,64	47,09	44,91
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,33	0,78	0,94	1,35	1,34
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	0,00	2,63	2,63	1,85	1,61
	Proporción de personas con consulta del adulto	14,13	15,34	5,58	7,73	4,58
	Proporción de personas con consulta del joven	15,36	28,30	24,08	29,76	22,72

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,09	0,35	0,78	1,19	0,76
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	25,38	44,86	39,08	52,47	40,00
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	18,89	15,39	12,42	16,63	12,03
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	33,49	58,12	66,25	71,87	71,82
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,17	0,08	0,11	0,01	0,01
17446 – MARULANDA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	12,50	50,00	16,67	32,00	33,33
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	12,50	50,00	22,22	28,00	16,67
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	37,50	0,00	16,67	56,00	66,67
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	12,50	50,00	66,67	84,00	66,67
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	0,00	0,00	16,67	56,00	66,67
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	12,50	50,00	22,22	48,00	66,67
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	12,50	50,00	22,22	32,00	33,33
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	5,78	38,64	59,93	74,91	80,29
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	3,62	11,43	44,12	48,39	38,27
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	2,86	14,76	39,47	50,23	32,57
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	3,81	14,46	43,94	54,07	53,97
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,38	1,15	1,15	3,42	3,79
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
	Proporción de personas con consulta del adulto	0,32	7,31	14,24	41,41	16,55
	Proporción de personas con consulta del joven	2,41	18,77	28,68	47,04	28,20
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,00	0,00	4,84	5,13	0,50
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	14,91	18,05	34,56	49,13	27,41
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	10,00	10,45	12,99	28,82	21,27

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	17,93	32,99	63,03	73,33	74,80
	Razón de condones entregados a personas con ITS			0,00	0,00	1,00
17486 – NEIRA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	8,89	6,00	21,93	17,15	12,60
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	12,22	10,00	27,19	49,79	62,99
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	14,44	17,00	15,79	25,52	59,06
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00			
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	31,11	33,00	57,02	77,41	59,84
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	12,22	18,00	21,05	36,40	28,35
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	30,00	30,00	47,37	84,94	82,68
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	21,11	17,00	30,70	24,69	12,60
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	3,98	11,51	19,94	51,68	55,88
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	2,81	5,99	9,56	28,01	26,48
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	3,32	7,94	10,45	30,32	26,74
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	5,74	14,42	18,75	41,87	44,79
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	2,63	10,90	13,68	15,99	15,49
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	0,00	0,00	4,88	3,33	3,85
	Proporción de personas con consulta del adulto	1,04	5,45	6,47	25,61	15,96
	Proporción de personas con consulta del joven	1,75	5,68	9,01	25,61	24,74
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,23	2,42	5,59	5,79	4,75
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	7,03	8,88	11,13	26,20	24,49
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	2,63	4,26	4,59	29,88	27,91
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	16,07	25,18	33,31	54,38	58,75
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,24	0,14	0,33	0,15	0,08

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
17495 – NORCASIA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	14,81	0,00	7,20	15,79	50,00
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	5,56	0,32	0,80	13,16	25,00
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	5,56	1,58	5,60	5,26	50,00
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	0,00	0,00		0,00	
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	50,00	0,95	16,00	3,95	50,00
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	0,00	0,32	3,20	5,26	25,00
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	9,26	0,63	14,40	43,42	50,00
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	14,81	0,32	11,20	17,11	50,00
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	21,65	27,04	48,47	63,08	60,62
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	1,37	2,35	6,91	10,58	4,80
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	7,36	1,76	12,46	11,20	2,16
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	0,94	3,36	3,56	8,24	8,24
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,19	0,35	0,17	0,49	0,49
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proporción de personas con consulta del adulto	1,01	30,84	3,24	14,40	1,90
	Proporción de personas con consulta del joven	1,82	19,15	3,48	9,49	2,77
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,00	0,25	2,62	6,12	0,51
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	5,72	13,85	16,11	15,48	3,04
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	2,31	0,79	1,64	4,07	2,14
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	22,49	51,77	65,85	71,78	70,78
Razón de condones entregados a personas con ITS	0,04	0,00	0,00	0,43	0,80	
17513 – PÁCORA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	21,79	0,84	24,00	8,60	0,00
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	14,29	1,26	14,67	4,30	0,00

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	12,82	17,44	15,33	12,90	10,64
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00	0,00		
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	25,64	14,29	86,00	84,95	89,36
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	14,10	3,78	49,33	43,01	61,70
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	30,77	26,68	62,00	65,59	74,47
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	30,77	3,57	39,33	19,35	0,00
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	27,21	33,63	40,86	48,15	54,25
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	5,79	6,42	11,21	13,18	10,55
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	14,98	14,82	34,83	36,29	21,67
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	19,52	28,07	47,90	48,97	48,04
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,32	1,67	2,45	3,18	3,11
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	14,29	9,52	26,83	24,39	25,00
	Proporción de personas con consulta del adulto	1,30	11,62	9,74	11,59	6,88
	Proporción de personas con consulta del joven	9,52	17,18	24,27	21,19	15,52
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,32	0,59	2,01	3,28	2,05
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	16,38	12,63	26,53	35,53	19,49
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	9,98	3,83	9,18	14,06	12,02
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	35,91	45,74	61,41	64,87	65,40
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,00	0,00	0,08	0,25	0,01
17524 – PALESTINA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	5,00	10,64	4,76	8,48	3,17
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	11,63	11,70	6,12	7,88	3,17
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	10,00	28,72	8,84	7,88	23,02
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00			

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	7,50	17,02	8,16	6,06	26,19
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	10,00	11,70	6,12	6,67	4,76
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	15,00	47,87	8,16	10,91	11,11
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	12,50	13,83	6,80	8,48	4,76
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	7,38	10,66	15,86	15,37	14,99
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	3,89	5,47	7,85	14,87	16,53
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	1,96	4,55	5,17	5,79	6,49
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	8,24	13,16	16,93	16,73	17,27
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	3,77	11,69	14,90	14,94	14,60
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	33,33	20,00	4,76	16,67	20,83
	Proporción de personas con consulta del adulto	5,65	4,73	7,51	7,69	5,65
	Proporción de personas con consulta del joven	2,98	3,11	12,95	16,59	17,40
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,18	1,14	3,39	3,76	3,91
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	5,16	5,12	17,60	19,81	15,16
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	0,32	0,83	2,54	7,86	9,29
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	14,95	20,83	39,80	48,80	52,01
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,06	0,00	0,15	0,33	0,50
17541 – PENSILVANIA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	43,02	3,02	24,53	22,04	27,87
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	23,84	3,96	34,43	31,72	31,15
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	25,14	9,19	42,92	67,74	49,18
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	0,00	0,00		0,00	0,00
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	39,11	8,81	70,75	65,59	52,46
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	18,44	4,09	23,58	30,65	40,98

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	75,42	9,57	44,81	52,15	49,18
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	50,84	3,52	26,42	26,88	29,51
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	22,03	41,81	60,72	82,05	82,88
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	17,99	27,66	33,81	48,65	43,47
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	35,81	41,49	45,91	51,82	37,97
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	52,50	64,67	68,69	70,71	68,71
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	1,50	2,56	3,15	2,30	2,17
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	3,03	0,00	1,14	2,74	2,99
	Proporción de personas con consulta del adulto	22,59	31,99	28,62	48,18	47,11
	Proporción de personas con consulta del joven	14,92	50,94	61,64	71,24	66,31
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,46	0,34	1,14	2,82	0,82
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	36,76	46,68	56,54	68,47	27,76
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	34,70	35,11	32,58	50,66	43,29
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	63,25	74,82	84,43	89,64	89,88
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,06	0,00	0,17	0,31	0,41
17614 – RIOSUCIO	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	8,26	33,50	71,53	65,27	50,51
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	24,79	32,49	36,61	29,89	25,46
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	18,18	19,40	39,66	61,71	68,02
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00	100	100	
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	28,10	75,57	94,24	61,39	30,14
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	18,18	50,13	58,64	59,94	51,73
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	27,27	60,96	88,14	87,72	72,51
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	9,92	37,53	72,54	71,73	58,45

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	10,04	17,92	29,19	57,73	61,88
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	3,39	8,79	9,10	19,69	17,36
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	4,40	7,41	15,37	20,93	18,14
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	6,51	26,84	36,69	44,42	49,88
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	3,01	6,63	7,91	7,52	7,27
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	5,26	2,51	5,90	8,12	9,41
	Proporción de personas con consulta del adulto	9,49	10,28	8,11	16,84	11,68
	Proporción de personas con consulta del joven	8,58	7,10	7,52	19,78	12,75
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,35	0,06	0,36	0,56	0,61
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	7,51	13,07	12,88	24,68	22,66
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	11,39	8,82	5,40	21,21	15,57
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	19,17	36,21	48,58	61,57	64,69
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,07	0,31	0,22	0,54	0,05
17616 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	36,21	5,71	5,19	14,41	9,80
RISARALDA	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	12,07	3,33	7,41	17,12	15,69
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	13,79	1,90	9,63	18,92	11,76
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00			
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	41,38	7,62	14,81	47,75	25,49
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	15,52	5,71	5,93	9,01	5,88
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	51,72	20,00	21,48	29,73	13,73
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	53,45	11,90	8,15	20,72	9,80
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	15,30	39,35	46,85	57,83	61,15
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	9,84	14,09	14,50	22,83	22,49

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	7,77	8,17	10,41	13,43	8,68
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	6,68	8,97	10,89	15,38	16,29
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	2,54	5,42	5,92	4,71	4,53
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	16,67	33,33	30,00	16,67	18,18
	Proporción de personas con consulta del adulto	2,62	13,14	11,06	20,06	9,91
	Proporción de personas con consulta del joven	5,75	12,65	17,22	22,74	17,04
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,22	0,11	1,45	1,95	0,73
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	12,20	18,23	23,22	38,78	20,53
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	1,93	2,62	5,10	23,86	15,38
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	24,06	50,42	64,75	72,13	74,75
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,84	0,11	0,36	0,25	0,31
17653 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	30,50	20,63	43,59	41,01	23,53
SALAMINA	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	13,97	22,75	24,10	36,69	55,88
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	36,17	31,22	59,49	76,98	88,24
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00			
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	44,68	42,86	64,10	70,50	82,35
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	11,35	21,16	44,62	74,82	85,29
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	36,17	26,98	57,44	92,09	85,29
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	33,33	24,34	56,41	43,88	26,47
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	19,81	45,45	69,95	82,28	86,42
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	7,65	14,19	24,85	37,82	38,91
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	12,69	13,86	34,72	44,92	40,87
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	15,68	26,15	48,68	59,56	60,92

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	2,41	8,81	10,09	13,03	13,20
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	23,53	15,29	18,31	15,63	14,97
	Proporción de personas con consulta del adulto	7,10	8,77	9,55	13,85	10,08
	Proporción de personas con consulta del joven	8,88	20,08	29,24	38,04	34,19
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,68	0,94	2,25	3,88	3,78
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	9,00	17,79	31,78	38,82	31,19
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	3,31	6,10	13,20	20,01	19,95
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	24,97	43,14	60,29	68,98	70,82
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,13	0,02	0,14	0,20	0,14
17662 – SAMANÁ	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	23,11	2,68	4,84	4,62	19,61
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	7,79	0,58	9,34	23,08	50,98
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	50,20	7,22	13,49	9,74	11,76
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	100	0,00	0,00		0,00
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	58,17	5,70	24,57	46,67	56,86
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	2,39	0,81	1,04	14,36	33,33
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	60,16	13,50	17,65	18,46	31,37
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	26,69	3,96	7,61	8,72	21,57
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	40,89	48,63	53,49	68,09	73,23
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	22,33	22,25	24,21	38,37	30,22
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	27,62	25,61	18,36	37,19	27,79
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	20,24	29,88	33,59	42,68	42,69
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,46	0,72	0,91	1,15	1,35
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	12,90	3,49	3,23	1,43	3,23

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de personas con consulta del adulto	4,68	22,44	14,09	22,84	7,66
	Proporción de personas con consulta del joven	7,63	20,60	9,59	24,93	15,80
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,07	0,36	1,80	2,96	0,82
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	17,99	15,80	24,35	49,17	25,10
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	10,03	8,25	3,71	19,35	10,34
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	37,40	48,16	58,18	73,68	77,60
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,43	0,00	0,04	0,25	0,36
17665 –						
SAN JOSÉ	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	11,11	0,00	9,68	5,00	0,00
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	11,11	10,53	12,90	15,00	37,04
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	0,00	7,89	61,29	91,67	92,59
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00			
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	22,22	65,79	77,42	93,33	96,30
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	33,33	63,16	32,26	18,33	55,56
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	44,44	65,79	74,19	86,67	81,48
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	44,44	68,42	54,84	10,00	0,00
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	4,73	13,20	27,58	38,18	48,91
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	2,83	9,51	8,92	18,58	22,80
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	0,91	4,00	8,61	17,34	20,73
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	2,29	8,95	31,29	47,00	48,51
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	1,00	2,34	2,31	4,68	4,28
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	50,00	33,33	14,29	18,75	22,22
	Proporción de personas con consulta del adulto	2,20	2,79	3,54	9,18	9,67
	Proporción de personas con consulta del joven	2,55	10,01	15,67	27,89	31,74

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,00	0,47	0,27	0,28	0,81
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	3,62	32,39	27,77	58,49	59,63
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	1,97	4,87	10,95	16,26	16,70
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	8,57	40,34	52,89	72,89	75,68
	Razón de condones entregados a personas con ITS	1,00	0,33	1,00	0,10	0,00
17777 – SUPÍA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	22,86	9,20	17,03	41,05	31,03
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	25,24	10,98	17,39	26,54	25,86
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	12,38	8,90	16,67	28,70	27,59
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00		0,00	0,00
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	41,43	19,29	42,75	42,28	35,34
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	12,86	18,40	29,35	45,06	33,62
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	34,76	24,63	19,93	49,07	43,10
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	44,29	21,07	19,93	48,77	37,07
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	26,83	27,39	37,90	50,45	51,29
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	22,64	22,55	12,68	31,21	27,93
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	6,75	11,01	14,84	20,74	14,37
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	9,67	16,08	21,43	24,97	28,65
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	2,80	7,00	9,35	9,62	9,41
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	10,87	6,74	15,20	22,70	21,86
	Proporción de personas con consulta del adulto	9,10	12,15	8,92	11,42	7,66
	Proporción de personas con consulta del joven	18,12	17,01	9,27	20,08	19,46
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	0,51	0,88	1,68	3,57	2,72
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	13,35	14,71	15,95	19,87	14,90

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	7,77	7,11	6,19	11,98	11,39
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	33,73	40,87	50,25	56,78	58,14
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,26	0,10	0,29	0,44	0,88
17867 – VICTORIA	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	38,55	19,57	30,30	63,27	91,18
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	34,62	7,61	9,09	44,90	55,88
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	6,02	1,09	4,55	38,78	14,71
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	100	0,00			
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	72,29	14,13	15,15	65,31	47,06
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	30,12	10,87	12,12	51,02	20,59
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	66,27	26,09	19,70	67,35	32,35
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	40,96	22,83	42,42	67,35	94,12
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	29,25	23,68	25,38	40,40	42,93
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	10,59	13,60	13,20	12,19	8,39
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	24,84	27,25	30,44	22,19	15,30
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	15,99	19,21	18,45	14,34	14,55
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	0,51	1,50	1,99	2,51	3,05
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	0,00	3,45	3,57	5,36	3,70
	Proporción de personas con consulta del adulto	20,21	13,36	17,96	9,56	3,21
	Proporción de personas con consulta del joven	10,70	10,65	16,22	12,36	4,10
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	1,22	3,46	3,95	1,74	1,68
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	6,78	2,40	3,37	13,27	6,87
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	2,98	3,50	4,36	2,33	1,98
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	31,38	38,62	66,48	72,33	74,59

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,08	0,02	0,05	0,56	0,60
17873 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	25,38	20,93	8,59	9,36	5,52
VILLAMARÍA	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	29,12	13,18	14,13	22,22	35,91
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	32,31	45,48	21,05	38,89	49,72
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		0,00			
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	51,15	27,39	6,37	31,29	58,56
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	43,08	20,16	11,63	19,01	28,18
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	45,77	40,57	18,56	44,44	59,67
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	33,85	26,87	17,17	16,67	10,50
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	30,56	35,12	37,51	54,16	64,08
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	13,22	12,19	11,97	26,91	28,41
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	12,94	11,50	8,85	21,48	19,76
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	13,58	20,54	24,67	32,71	37,65
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	10,60	21,07	23,80	24,67	23,01
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	10,53	11,36	20,99	22,03	18,83
	Proporción de personas con consulta del adulto	10,51	11,47	6,69	11,28	15,28
	Proporción de personas con consulta del joven	6,95	18,62	20,53	28,43	26,17
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	1,40	3,89	6,92	9,47	6,43
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	18,23	26,34	28,47	40,25	34,39
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	3,47	5,78	15,80	20,84	18,21
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	47,80	63,05	71,75	79,13	80,76
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,04	0,24	0,23	0,20	0,27
17877 –	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	15,69	10,11	19,02	27,14	25,86

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
VITERBO	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	11,49	7,02	27,17	43,57	48,28
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	22,22	16,01	12,50	13,57	27,59
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado		1,52	100		
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	26,80	20,79	42,39	47,14	25,86
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	10,46	16,57	19,02	23,57	25,86
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	28,10	23,31	23,37	35,71	25,86
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	16,99	12,64	21,74	40,00	25,86
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	37,53	42,02	58,19	65,12	65,62
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	14,48	16,19	18,33	34,96	13,94
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	9,19	12,60	24,44	27,07	10,06
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	13,15	19,41	22,75	23,81	24,74
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	5,35	8,08	12,69	16,61	17,86
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	29,41	9,52	25,00	18,00	23,53
	Proporción de personas con consulta del adulto	25,42	27,77	31,53	28,14	9,12
	Proporción de personas con consulta del joven	16,81	29,84	27,85	35,16	17,43
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	2,47	2,28	5,67	8,30	0,67
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	26,83	25,81	37,07	43,99	18,50
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	7,04	15,02	14,35	21,48	6,60
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	54,47	67,23	76,79	81,34	81,60
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,03	0,00	0,05	0,09	0,70
TOTAL CALDAS	Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	15,24	13,19	23,62	33,35	30,69
	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	22,79	15,70	27,74	36,94	45,17
	Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	15,86	21,29	29,56	44,57	55,90

MUNICIPIO	INDICADOR	2014	2015	2016	2017	2018-03
	Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	70,00	0,27	15,52	38,24	31,25
	Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	32,30	27,16	35,76	41,26	49,54
	Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	14,74	13,05	22,50	33,25	38,61
	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	27,22	25,39	36,92	54,37	44,41
	Proporción de gestantes con tamizaje para VIH	20,10	17,67	30,66	40,11	33,94
	Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo	29,72	38,97	49,43	61,84	64,92
	Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar	13,45	14,59	20,94	35,27	26,85
	Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar	16,10	14,23	18,09	31,80	25,04
	Proporción de mujeres con toma de citología cervico uterina	12,11	20,36	29,31	41,16	42,47
	Proporción de mujeres con toma de mamografía	7,27	12,85	15,43	16,07	16,03
	Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad	7,64	5,99	9,58	8,82	8,98
	Proporción de personas con consulta del adulto	12,42	15,88	18,21	24,85	18,91
	Proporción de personas con consulta del joven	12,12	16,48	20,87	30,20	25,01
	Proporción de personas con consulta por oftalmología	2,36	3,78	6,96	9,40	5,61
	Proporción de personas con control de placa bacteriana	17,34	17,04	23,61	32,53	22,31
	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	8,63	7,72	11,05	19,17	13,34
	Proporción de población con valoración e intervención del riesgo	48,61	60,35	71,08	77,83	79,39
	Proporción de recién nacidos con Sífilis Congénita y tratamiento terminado	0,00			60,00	
	Razón de condones entregados a personas con ITS	0,05	0,06	0,21	0,23	0,36

FUENTE: Bodega de Datos SISPRO (SGD)